

GUÍA DOCENTE DE



¡Bienvenido/a al Zoo!

Los zoológicos del siglo XXI tienen como principal objetivo el compromiso de :

EDUCAR , CONCIENCIAR Y CONSERVAR

EDUCAR

- En el respeto al Medio Ambiente.
- Dando a conocer la fauna y flora que cohabitan en el parque.
- Sobre las amenazas a las que se enfrentan estas especies, principalmente por la acción del ser humano.

CONCIENCIAR

- De la importancia de nuestros actos en la naturaleza.
- Sobre el rol ecológico que ejercen las especies así como las consecuencias de su desaparición.



CONSERVAR



- Participando en programas de cría de especies amenazadas (EEP) de la EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios).
- Colaborando con proyectos ex situ e in situ a través de la Fundación Parques Reunidos.
- Proporcionando a la comunidad científica un entorno excepcional para entender las necesidades de las especies que necesitamos cuidar en la naturaleza.

Cada año destinamos medios económicos y humanos a los distintos proyectos con los que colaboramos, tanto de conservación como de educación e investigación, sin olvidar a los grandes protagonistas de esta labor, la fauna que habita en nuestros parques, porque sin ellos, nada de esto sería posible.

ÍNDICE



- **Mapa.**
- **Pórtico de la Naturaleza.**
- **Cañón de las Aves.**
- **Poblado Central.**
 - **Gruta de la Noche.**
 - **Reptilario.**
 - **Reserva de los Lagos.**



Dime qué comes...

CONSUMIDORES SECUNDARIOS

Carnívoros y omnívoros:
Regulan el tamaño de la población de las especies de las que se alimentan, manteniendo así el equilibrio ecológico.

CONSUMIDORES TERCIARIOS


Carnívoros-Carroñeros:
Mantienen el hábitat saludable eliminando restos orgánicos, y lo que queda de estos restos son usados después por los organismos descomponedores.

CONSUMIDORES PRIMARIOS

Herbívoros:
Contribuyen en el mantenimiento del equilibrio energético.

PRODUCTORES

Plantas: son capaces de fabricar materia orgánica a partir de la materia inorgánica del suelo y de la energía del sol.



DERRIBANDO ESTIGMAS

Hay especies que generan rechazo, pero desempeñan funciones ecológicas muy necesarias para el buen desarrollo de los ecosistemas.



Se alimentan de **materia vegetal** o **animal en descomposición** y **participan en el ciclo del nitrógeno**.




Solo 3 de las especies de quirópteros son hematófagos (se alimentan de sangre) el resto, son **insectívoros**, **nectarívoros** y **frugívoros**.



Mantienen los ecosistemas naturales equilibrados. **Sin ellos, el número de especies de presas como los ratones, aumentarían a niveles no naturales.**

Pórtico de la naturaleza



QUEPARDO

(*Acinonyx jubatus*)



Es el **mamífero** terrestre **más rápido del mundo**. Acelera de 0 a 96 km/h en apenas tres segundos.

Este gran felino es sumamente ágil cuando se mueve a gran velocidad y es capaz de hacer giros rápidos e inesperados persiguiendo a su presa. Estas persecuciones le suponen un enorme gasto de energía, por lo que suelen durar 15-20 s. **Sus garras no son completamente retráctiles** para ayudar a la tracción. Poseen dos lagrimas negras para ayudarle a cazar durante el día evitando los reflejos del sol. **No puede rugir**, a diferencia de las especies del género *Panthera*; Cazan a sus presas usando su espolón trasero.



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA y ASIA

IUCN: VULNERABLE



TORTUGA LEOPARDO

(*Stigmochelys pardalis*)



La dieta incluye una amplia variedad de plantas.

También se ha observado la ingestión ocasional de huesos, cenizas o heces.

Se sabe que esta especie es un importante dispersor de semillas en el Parque Nacional de Elefantes Addo, donde su biomasa supera a la de la mayoría de los otros herbívoros. Como no "mastica" como la mayoría de los mamíferos herbívoros, las semillas pasan intactas a través del tracto digestivo. Por lo tanto, es de mayor importancia como **dispersor de semillas** que los ungulados

CLASE: REPTIL


REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ASIA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

MUNTJAC (*Muntiacus reevesi*)



Son uno de los **ciervos más pequeños**. Pueden alcanzar los 45 centímetros de altura, sin incluir la cabeza. Sus hábitos son por lo general crepusculares, es decir, registran su máxima actividad al anochecer y al amanecer. **Poseen dos glándulas pre - orbital junto a los ojos** para marcar el territorio o atraer a las hembras.

Se alimenta de semillas de bambú, corteza, frutos y follaje, aunque también come huevos y carroña; puede cazar pequeños mamíferos y aves que anidan en tierra.

Se les conocen como **ciervos ladrones**.



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR


MANGOSTA RAYADA (*Mungos mungo*)



Especie principalmente carnívora, aunque también come frutas. Las manadas al completo cuidan a las crías, discapacitados/enfermos y ancianos. **Se alimentan de presas peligrosas como las serpientes**, y debido a su metabolismo alto comen con frecuencia. Cuando la manada abandona la guarida en busca de alimento, algunos miembros, generalmente hembras pero también machos, se quedarán a cuidar de las crías.

En España tenemos la mangosta Europea, conocida con el nombre de *Meloncillo*

Pórtico de la naturaleza



CASUARIO DE CERAM

(*Casuarus casuarus*)



Sus **patas son muy largas y fuertes** para correr y defenderse, también cuenta con tres robustos dedos en cada pie. Sobre su cabeza hay un **gran casco óseo** que está hecho de hueso trabecular y cartílago, sus alas son vestigiales y su cuerpo muy pesado como para volar. **El cuidado de las crías y la incubación las realiza el macho.**

Sus huevos son **de color verde** para poder camuflarse entre la hierba.

Es un ave muy solitaria, tímida y muy territorial, defenderá su hogar a toda costra de cualquier amenaza.



CLASE: AVE

REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: FRUGÍVORO

DISTRIBUCIÓN: OCEANÍA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

SURICATA (*Suricata suricatta*)



Es un animal **diurno** que se refugia en grandes galerías subterráneas.

Es un **hábil excavador**, capaz de hacer múltiples entradas para unos espacios que solamente abandona durante el día. Las **colonias** de suricata alcanzan los **40 individuos**.

Su **pelaje** se densifica en el dorso, el cual constituye una herramienta **termorreguladora** que le ayuda a acumular el calor solar y diurno, este calor "almacenado" se va liberando progresivamente cuando descienden las temperaturas.

Se **alimenta** sobre todo de artrópodos y **pequeños mamíferos**.

Siempre designan a uno de los suyos como **centinela** para permanecer atento ante los posibles peligros.



EJEMPLARES INCAUTADOS DEL TRÁFICO ILEGAL

CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO


DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza

GUANACO

(*Lama guanicoe*)



Es el camélido que vive más al sur de la tierra. Los guanacos son los parientes sureños de las llamas, y tienen la misma habilidad que éstas para **escupir la hierba** que consumen como mecanismo de defensa.

Son animales muy sociables que **vive en grupos de hasta 20 individuos**. Poseen una gran agilidad a la hora de escapar de posibles depredadores ya que viven en lugares abiertos, y debido a que suelen poseer de más vegetación que sus parientes los camellos no desarrollan joroba.



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: AMERICA SUR

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

GACELA DORCA

(*Gazella dorcas*)



Esta gacela posee unos colores idóneos para desvanecer en el paisaje, es lo que se conoce como el "**contra - sombreado**" Oscuros por la parte dorsal y más claros por la parte ventral.

Esta gacela sufrió un grave retroceso en el norte de África, siendo ésta de gran importancia en los zoológicos. Su conservación y reproducción ha conseguido como resultado poder **repoblar algunos parques y reservas del norte de África**.



Machos y hembras poseen cuernos.

CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: VULNERABLE

Pórtico de la naturaleza



PUERCOESPÍN AFRICANO



(*Hystrix africaeaustralis*)

Roedor gigante que se caracteriza por sus largas púas blancas y negras, que le recubren enteramente el dorso, los flancos y la cola.

De carácter tranquilo y huidizo, cuando se ve amenazado se muestra bastante agresivo: **eriza las púas** y las sacude haciendo sonar su cola. Las púas no se hallan sólidamente implantadas en la piel, por lo que en caso de agresión de un depredador las desprenderá, causándole heridas.

Las púas no tienen veneno, pero si contienen bacterias que pueden llegar a causar graves infecciones.



●● **CLASE:** MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR ●●



●● **CLASE:** MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ASIA
IUCN: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN ●●


PANDA ROJO (*Ailurus fulgens*)



La palabra panda significa: "comedor de bambú" procedente de una lengua Nepalí. Su cola grande y espesa añade 46 cm a su cuerpo y la usa como abrigo en las frías cumbres de las montañas. **Pasa la mayor parte del tiempo en los árboles** donde incluso duerme. Es crepuscular y nocturno. Color rojo debido a la coloración típica de bosques asiáticos y su musgo y oscuro por el vientre para los depredadores terrestres con el sombreado.

Le encanta el bambú, aunque también se alimenta de frutas, bellotas, raíces y huevos. Debido a que no puede digerir la celulosa, necesita consumir grandes cantidades de bambú para sobrevivir. Se creía que estaba evolutivamente relacionado con los osos panda, pero en realidad son más cercanos a los mapaches, aunque poseen su propia Familia.

Pórtico de la naturaleza



MACACO DE GIBRALTAR

(*Macaca sylvanus*)



Se desplaza siempre a cuatro patas, sin adoptar la postura erguida, y aunque pasa mucho tiempo en el suelo puede subir a los árboles cuando sea necesario.

Es el único primate, además del ser humano, que habita en Europa. Posiblemente fueron introducidos por el humano, se les suministra alimento y gozan de protección legal.

Forman grupos de 15 a 60 individuos, existe un sistema jerárquico matriarcal y los machos pueden cuidar de las crías aunque no sean suyas.

Son muy importantes para los ecosistemas donde viven, pues **son grandes dispersores de semillas.** En Gibraltar no se ve amenazado pero en el norte de África la situación es distinta, sobre todo por la captura de crías como animales de compañía.



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA Y GIBRALTAR

IUCN: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



BURRO MARROQUÍ

(*Equus africanus asinus*)



Esta especie proviene de domesticar el asno salvaje africano. **Ha sido utilizado como animal de carga** hasta la aparición de la maquinaria agrícola, que ha supuesto un descenso considerable de sus poblaciones. En estado salvaje suele ser un animal solitario.

CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: NO EVALUADO

Pórtico de la naturaleza



OSTRERO EUROASIÁTICO

(*Haematopus ostralegus*)

Es un ave limícola inconfundible (que viven en el lodo) con sus colores blanco y negro y su gran característico **pico rojo adaptado para el consumo de bivalvos y cangrejos** que va encontrando gracias al sentido del tacto con su pico.

En España se encuentra dentro del libro rojo lo que quiere decir que en nuestro país es un ave bastante amenazada debido al impacto humano, principalmente **destrucción del hábitat** afectado así a su reproducción, así como la falta de agua.



CLASE: AVE

REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: INSECTÍVORO

DISTRIBUCIÓN: EUROPA Y ASIA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



AVOCETA COMÚN

(*Recurvirostra avosetta*)

Es un ave elegante de largas patas, y con un pico muy inusual debido a su curvatura inversa. **Pico conocido como "cose sacos"** por la forma similar a las agujas que se usaban para coser los sacos. Va buscando su alimento bajo el lodo, moviendo el pico y capturando lombrices e insectos gracias a su gran sensibilidad y tacto.

Es un ave residente en España, que se encuentra amenazada debido a la pérdida de humedales.

CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: INSECTÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA Y ESPAÑA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza



MORITO COMÚN

(*Plegadis falcinellus*)

Es el único ibis que cría de forma natural en Europa. El adulto reproductor es pardo, muy rojizo, y en la cara presenta unas líneas blancas muy llamativas que bordean la comisura del pico. El adulto no reproductor es mucho más apagado, con el pico más oscuro y sin las líneas blancas en su borde, y con numerosas pintas blancas alargadas en el cuello y la cabeza.

El morito común se incluye en el Libro Rojo de las aves de España 2021 en la categoría de NT -Casi Amenazada como reproductora y en la de LC -Preocupación Menor como invernante. También aparece citada en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



CLASE: AVE

REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: INSECTÍVORO

DISTRIBUCIÓN: EUROPA Y ASIA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



PORRÓN PARDO

(*Aythya nyroca*)



Esta especie está en peligro en España debido al gran descenso de humedales. Poseen dimorfismo sexual, (que se observan diferencias físicas de una misma especie entre sexos). Los machos tienen el iris de color blanco, y las hembras los tiene color pardo. El comportamiento habitual es nadar, y sumergirse para alimentarse de plantas acuáticas.

CLASE: AVE


REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA, EUROPA Y ASIA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza



CABRA ENANA (*Capra hircus*)




La cabra doméstica proviene de la especie salvaje *Capra aegragus cretica*, **originaria de la cuenca mediterránea**. En esta especie existe dimorfismo sexual siendo el macho de mayor tamaño que la hembra. Posee una coloración muy variable, desde ejemplares blancos hasta negros y con variedad de manchas de colores intermedios. Es gregario: vive en grupos de hasta 20 individuos, siendo éstos matriarcales.



Zona interacción.

Mantener espacio y respeto a los animales



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: CUENCA MEDITERRÁNEA

IUCN: NO CORRESPONDE



CAIMÁN DEL MISSISIPI

(*Alligator mississippiensis*)



Puede alcanzar los 6 m. Se caracteriza porque el cuarto diente mandibular se ajusta dentro de la mandíbula al contrario que el cocodrilo, no siendo visibles con la boca cerrada. Los reptiles son animales de sangre fría, no pueden regular su propia temperatura por lo que permanecen inmóviles durante todo el día. La temperatura a la que son incubados los huevos determinará el sexo de las crías, **entre 32°-33° nacerán más machos y entre 27°-30° nacerán más hembras. Se le conoce como sexo dependiente de la temperatura.**



CLASE: REPTIL

REPRODUCCIÓN: OVÍPARO


ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: NORTEAMERICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



Pórtico de la naturaleza



FLAMENCO ENANO



(*Phoeniconaias minor*)

Se encuentra en estado salvaje en vastos humedales del continente africano, así como en algunos países del sur y suroeste de Asia. Los lagos alcalinos y salinos son hábitats comunes de la especie. La mayor población habita en los lagos alcalinos del Gran Valle del Rift en el África oriental. **Su dieta le confiere su característico color rosado, obtenido de los crustáceos microscópicos que consumen.**

Vive en grandes grupos que pueden contener miles y hasta 1 millón de miembros. **Suelen verse posados a una sola pata, debido a que de esa manera conservan el calor al no exponer las dos patas al exterior.**

Su principal amenaza la destrucción y contaminación de su hábitat.

CLASE: AVE
REPRODUCCIÓN: OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: CASI AMENAZADO

DIK-DIK DE KIRK

(*Madoqua kirkii*)



Es considerado uno de los antílopes más pequeños de África, y al igual que los Muntjak, también poseen unas glándulas pre-orbitales junto a los ojos para marcar territorio.


Una de las cosas más características es su **hocico prensil** y su forma de escapar en "Zig-Zag".

Una de sus amenazas se debe a su caza por piel, para la elaboración de guantes.



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: HERVÍBORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza



CALAO TERRESTRE

(*Bucorvus leadbeateri*)



Es la especie más grande de cálo llegando a pesar hasta casi 6 kg. Los cálo suelen destacar por poseer sobre el pico un apéndice corneo.

Poseen una bola característica bajo el pico llamado "saco gular", que pueden hinchar por diferentes motivos.

Presentan un dimorfismo sexual determinado en la coloración del saco gular, siendo rojizos en machos y azulados en hembras.

Son aves carnívoras y muy generalistas, consumiendo desde roedores, serpientes hasta insectos.

CLASE: AVE

REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

CALAO DE MEJILLAS PLATEADAS

(*Bycanistes brevis*)



Este cálo presenta un **llamativo pico** que se hace algo más corto en las hembras. Posee un color negro en la cabeza además de un moteado plateado que es lo que le da nombre al animal.

Es un ave solitaria que puede poner 1-2 huevos, y **se alimenta de fruta, insectos, huevos y hasta pequeños reptiles.**



CLASE: AVE


REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza



TURACO CARIBLANCO

(*Turaco leucotis*)

Esta especie habita principalmente en Etiopía. Esta familia Musophagidae es **exclusiva de poseer el turacoverdín, un pigmento único de uroporfirina de cobre responsable de la coloración verde brillante en las plumas.** Son pigmentos verdes verdaderos, a diferencia de las otras aves, donde el verde es el resultado de mezclar carotenoides azules y amarillos.



CLASE: AVE
REPRODUCCIÓN: OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: FRUGÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

TURACO DE GUINEA

(*Turaco persa*)

Desciende al suelo en contadas ocasiones, normalmente para alimentarse o beber, debido a que pasan la mayor parte del tiempo en la rama de los árboles. **No suele volar grandes distancias y solo utiliza el vuelo para desplazarse entre árboles o ramas,** aunque prefiere desplazarse mediante carreras y saltos entre las ramas. Estas aves **se alimentan de una gran variedad de frutas** tropicales silvestres y cultivadas pero también de flores y brotes, y a veces insectos.



CLASE: AVE
REPRODUCCIÓN: OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: FRUGÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



Ubicación: Zona elefantes (Con las tortugas sulcatas)

Pórtico de la naturaleza




TURACO DE LIVINGSTONE

(*Tauraco livingstonii*)



Su rango más distintivo es su **cresta que presenta una forma diferente a otras especies de turaco**, pues es más larga en la parte anterior de la cabeza y va decreciendo conforme se acerca a la nuca. Se extiende por el sureste del continente africano desde el sur de Tanzania hasta el norte de Sudáfrica. Habita en bosques tropicales costeros y de montaña hasta los 2500m de altitud.

Los turacos presentan unos ojos tan llamativos (generalmente rodeados por anillos de piel desnuda de colores vibrantes como rojo, amarillo o naranja) principalmente como una adaptación evolutiva para la identificación de la especie y la comunicación en el denso follaje de los bosques africanos donde habitan

Estos ejemplares fueron decomisados del tráfico ilegal y fueron destinados a Selwo aventura.

CLASE: AVE

REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN : FRUGÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

TOKO DE VON DER DECKEN

(*Tockus deckeni*)



El cálao de Von der Decken es un pequeño miembro de la familia de los cálaos y recibió su nombre en honor al explorador alemán barón Karl Klaus von der Decken, quien describió este ave en sus escritos sobre sus exploraciones en África.

El macho tiene un pico bicolor muy característico en rojo y marfil. La hembra tiene un pico completamente negro. El pico largo les permite buscar y recoger alimentos de ramas que de otro modo no podrían alcanzar. Sus alas cortas, anchas y redondeadas son eficientes para intervalos cortos de vuelo, pero no ideales para periodos prolongados.

Puedes encontrarlos en su instalación pero también dentro con los colobos ya que tenemos un tunel por el que ir de un sitio a otro.



CLASE: AVE


REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN : OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza



HIENA MANCHADA

(*Crocuta crocuta*)



La hiena manchada es la especie más grande de las cuatro existentes. Viven en clanes dominado por una hembra alfa.

Las hembras están masculinizadas ya que son mas grandes, agresivas y **poseen un aparato reproductor casi igual que el macho**. De ahí viene su estigma negativo, o el creer que solo son carroñeras. **Ellas son excelentes depredadoras.**

Tienen la espalda inclinada ya que poseen gran parte de la masa muscular en las patas delanteras y cuello, **puediendo transportar grandes trozos de carne a larga distancia.**

Comen también huesos, y son unas auténticas limpiadoras de la naturaleza.



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN : CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

COLOBO QUEREZA (*Colobus guereza*)



Se trata de una especie de primate que habita tanto en los bosques secos y húmedos así como en las praderas arboladas de África oriental y central.

Es el primate más grande entre todos los colobos, pudiendo alcanzar una longitud de 45 a 72 cm Su manto es negro y blanco para poder hacerse más invisible entre el sombreado bosque. **Su pelo largo blanco y negro los camufla en el bosque entre luces, sombras, y el daltonismo de sus depredadores.** La población ha disminuido drásticamente en los últimos 100 años debido al comercio de su pelo en el siglo XIX, y posteriormente por el crecimiento rápido de la población humana y la destrucción de su hábitat en África.



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN : HERBÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pórtico de la naturaleza



TOTA VERDE (*Chlorocebus aethiops*)



Generalmente su rostro es oscuro, rodeado de bigotes más o menos desarrollados. **Tienen, además, bolsas en las mejillas que le permiten forrajear y almacenar la comida para ser ingerida más tarde.**

El pelaje del tota verde es gris o amarillo oliva claro, con las partes inferiores blanquecinas. Son animales **altamente sociables**, viajan en grupos pequeños y son una de las pocas especies que pueden tener un número considerable de machos en cada grupo.

Para demostrar su jerarquía, los machos adultos de rango más alto colocan su cola en posición vertical y se pasean por delante de los otros machos. La especie del tota verde está muy extendida y no tiene grandes amenazas.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

GIBÓN DE MANOS BLANCAS (*Hylobates lar*)



Ha desarrollado una excelente vista y reflejos, fruto de su vida arbórea. De los cinco dedos de sus manos, usa cuatro para agarrarse a modo de garfio, mientras que el pulgar lo repliega y lo utiliza únicamente para trepar.

Hay varios morfotipos: Gibones dorados como los nuestros y a veces dan lugar a gibones negros.

El desplazamiento que realizan solo con los brazos se le llama **braquiación**.

Es el único primate que se desplaza habitual y espontáneamente erguido sobre los pies y con los brazos abiertos en forma de pértiga. La hembra, cuando está preñada, camina sobre la tierra a cuatro patas. Hembra y macho forman un "duo" monógamo para reforzar sus lazos de pareja, comunicándose entre sí con gritos. Vive en grupos familiares estables formados por la pareja y sus crías, que son expulsadas del clan una vez que alcanzan la madurez.



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ASIA
IUCN: EN PELIGRO

Pórtico de la naturaleza



TITÍ CARA BLANCA (*Callithrix geoffroyi*)



Este pequeño primate solo podemos encontrarlo en el **sudeste de Brasil**. La estructura social de esta especie es la unidad familiar, aunque en algunas ocasiones se ha podido observar esta especie en la naturaleza con hasta más de 5 individuos dentro del grupo.

En su comunicación destaca la voz, sobre todo la voz de alarma para indicar la presencia de depredadores comunes como las serpientes.

La alimentación más frecuente de estas especies son las frutas y los animales invertebrados.

Gran importancia ecológica por ser dispersores de semillas, regenerando así el bosque.

TITÍ DE GOELDI (*Callimico goeldii*)



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: FRUGÍVORO
DISTRIBUCIÓN: AMÉRICA SUR
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Vive en grupos de 6 a 8 individuos y a diferencia de otras especies de titís sólo hay un macho por grupo, que se aparea con todas las hembras. **La mayoría del tiempo lo pasa en las ramas más bajas de los árboles y rara vez sube por encima de los 5 m de altura para buscar fruta.** Se comunican entre ellos mediante vocalizaciones (gritos efectivos a más de 100 m), el olfato y el lenguaje corporal.

Su actividad es diurna con intervalos en los que se dedican a acicalarse mutuamente. Al llegar la noche todos los miembros del grupo duermen juntos en huecos de árboles y zonas de vegetación densa. Puede saltar de árbol en árbol a una distancia de hasta 4 m.



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: SUDAMÉRICA
IUCN: VULNERABLE

Pórtico de la naturaleza



TALAPOÍN NORTEÑO

(*Miopithecus ogouensis*)



El talapoin norteño es una de las especies de primate más pequeña de África. Viven principalmente en la zona de ecuatorial (Gabón, guinea ecuatorial) **Pueden vivir en grupos de hasta cien individuos**, aunque normalmente se reúnen en grupos familiares de quince miembros. Son completamente arbóreos y ocupan el estrato inferior de los árboles. A diferencia del Talapoin sureño, **el norteño tiene orejas y la piel de la cara color carne, y no negra**. A menudo se alimenta en el suelo, y su dieta está compuesta principalmente por frutas, y semillas aunque los insectos conforman más de un tercio de su dieta. A diferencia de la mayoría de los primates, **es un nadador hábil en zonas pantanosas y puede bucear bajo el agua en busca de alimento**.

Estos ejemplares fueron decomisados del tráfico ilegal y fueron destinados a Selwo aventura.



ESTORNINO PURPÚREO

(*Lamprotornis purpureo*)



Habitante de la sabana africana, destaca por su **intenso plumaje púrpura metálico y verde brillante**, el cual **no proviene de pigmentos, sino de nanoestructuras en sus plumas que reflejan la luz**. Estas aves sociables y ruidosas son conocidas por sus ojos amarillos intensos y su vuelo sincronizado en bandadas. **Se le llama colores iridiscentes**.

Estos colores son clave durante el cortejo, para la comunicación e incluso para evitar a los depredadores.

Puedes encontrarlos en su instalación pero también dentro con los colobos ya que tenemos un tunel por el que ir de un sitio a otro.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: FRUGÍVORO
DISTRIBUCIÓN: AMÉRICA SUR
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: SUDAMÉRICA
IUCN: VULNERABLE

Pórtico de la naturaleza



LEMUR DE COLA ANILLADA (*Lemur catta*)



Primate mediano cuya principal característica es la cola anillada en blanco y negro, lo que le da el nombre. El segundo dedo de sus extremidades traseras lo usan para acicalarse (garra de aseo); el resto de las uñas le sirven para trepar. **Son muy sociables y forman grandes grupos con hembras dominantes.** Es una hembra alfa la que dirige al grupo y lo mantiene unido. Las hembras viven en grupo toda su vida, mientras que los machos migran de grupo en grupo.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: MADAGASCAR
IUCN: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Los lémures de cola anillada machos y hembras tienen **glándulas odoríferas** en la zona genital, mientras que los machos también las tienen en muñecas y hombros, y cada uno produce olores diferentes. Esta «perfume de lémur» personalizada revela mucho sobre la salud de un lémur.

LEMUR RUFO (*Varecia variegata*)



La característica principal del Lemur Rufo es su **pelaje largo de color blanco y negro**. Es un animal sociable y vive en grupos de hasta 16 individuos. Los juveniles permanecen en el nido por varias semanas y no se agarran a la madre; cuando ésta se mueve lo transporta en su boca.

Este lemur pasa la mayor parte de su tiempo en el dosel del bosque y **muestra preferencia por los árboles grandes. El árbol de 12 m de alto conocido como «Árbol del viajero»** probablemente debe su existencia al Lémur rufo blanco y negro, que se creía ser el polinizador principal de la planta. Su principal amenaza es la destrucción de su hábitat por la tala de árboles maduros, la agricultura de roza y la quema que ha reducido los bosques de Madagascar.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: MADAGASCAR
IUCN: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Cañón de las Aves



IBIS ESCARLATA (*Eudocimus ruber*)



Presenta diferentes tonalidades dependiendo de la edad, siendo de un color rojo más intenso en los adultos y marrón en los juveniles, lo que les permite a estos camuflarse de sus depredadores.

El color rojo le viene dado de los pigmentos que tienen los crustáceos de los que se alimentan. Su pico curvado le permite buscar alimentos en zonas fangosas donde se alimenta durante el día, pero al oscurecer, vuela hacia árboles junto al agua para posarse en ellos.



CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: SUDAMÉRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



IBIS SAGRADO (*Threskiornis aethiopicus*)



Los ibis sagrados son nativos y abundantes en el África subsahariana y el sudeste de Iraq. Hay poblaciones introducidas en España, Italia y Francia, de individuos que escaparon del cautiverio y comenzaron a reproducirse con éxito.

Generalmente se encuentran cerca de ríos, arroyos y costas. Los ibis sagrados forman parejas monógama estacionalmente que anidan en grandes colonias de anidación, a menudo en islas marinas rocosas.

El nombre sagrado viene del antiguo egipcio, ya que la llegada de los Ibis coincidía con la recogida de las cosechas.

CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Cañón de las Aves



PINTADA VULTURINA

(*Acryllium vulturinum*)



Es una gallina africana de espectacular colorido que habita en la sabana de África oriental.

Contrasta la total desnudez de la parte anterior de la cabeza con el primer tramo del cuello, del que penden **largas plumas que adornan el pecho.**

La cabeza, a diferencia de otras pintadas, carece de carúnculas y de casco óseo. **Su vuelo es pesado por lo que suele ser de poca duración.**



CLASE: AVES

REPRODUCCIÓN: OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



Cañón de las Aves



LINCE IBÉRICO

(*Lynx pardinus*)



Felino de tamaño mediano. Es una especie forestal que habita en el **monte mediterráneo**, con un mínimo aproximado de un conejo por hectárea. El **conejo supone más del 90% de su alimentación**.

Posee una cola muy corta debido a su forma de cazar **"acecho-rececho"**, que consiste en esconderse y saltar directamente sobre ella, no usando así la velocidad, por lo tanto al tener la cola corta le da más precisión en el salto.

En el pasado vivía en toda la península pero durante el siglo XX su población descendió alarmantemente. **Gracias a los diferentes proyectos de conservación el lince está aumentando poco a poco.**



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: PENÍNSULA IBÉRICA
IUCN: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



NUTRIA ASIÁTICA UÑA CORTA (*Aonyx cinereus*)



Se encuentra más a gusto en el agua que en tierra firme. **Es una gran nadadora y buceadora que puede permanecer bajo el agua hasta 6 minutos** sin salir a respirar, al ser capaz de cerrar sus fosas nasales y oídos para evitar que el agua entre cuando está sumergida. Su tupido pelaje impermeable le permite mantener el calor de su cuerpo.

Vive en lagos, ríos, costas y arrozales asiáticos, en estos últimos **es muy apreciada porque los libra de los cangrejos**. Su dentadura también está bien preparada para masticar el duro caparazón de los crustáceos.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ASIA
IUCN: VULNERABLE

Cañón de las Aves



TÁNTALO AFRICANO (*Mycteria ibis*)



Habita en **humedales** con aguas poco profundas de 10-40 cm de profundidad para alimentarse, y bancos de arena o árboles para reposo.

Tiene una forma de pescar curiosa, dejando el pico sumergido entreabierto, y con la pata va buscando presas en el lodo. **Gracias a la forma de su pico puede consumir, peces, ranas, crustáceos, y en ocasiones pequeños mamíferos.**

La especie anida colonialmente en grupos de una o varias especies con hasta 10-20 pares por árbol.



CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN: OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



CIGÜEÑA DE ABDIN (*Ciconia abdimii*)



Especie gregaria se ve en grupos de hasta 10.000 habitantes. Crían en colonias que normalmente no superan las 20 parejas y construyen sus nidos a partir de palos y vegetación en árboles o acantilados. Estos se usarán de año en año a menos que se derrumben.

Es la especie de cigüeña más pequeña.

Viven en praderas abiertas, pastos y bosques de sabana, a menudo cerca del agua, pero también en áreas semiáridas. **Su dieta consiste casi en su totalidad de grandes insectos,** aunque también comen ratones, ranas, lagartijas, pequeños peces, moluscos, cangrejos...

Migran siguiendo las lluvias.

CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN: OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Cañón de las Aves




PINTADA MOÑUDA

(*Guttera pucherani*)



Habita en las zonas áridas y zonas de bosque de Kenia y Tanzania. Esta gallina presenta una intensa coloración roja y azul en su cabeza desnuda, y además porta un "tupé" muy característico de esta especie. Prefiere los bosques y matorrales, donde se alimenta en el suelo en busca de bayas, semillas y otras materias vegetales. La llamada de alarma es una serie de notas agitadas y traqueteantes que se aceleran y disminuyen



CLASE: AVES

REPRODUCCIÓN : OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



PAVO REAL (*Pavo cristatus*)



El pavo real es una de las aves más admiradas por los seres humanos. Presentan un gran dimorfismo sexual, donde las hembras tienen un color grisáceo ocultándose así mejor en la naturaleza, mientras que los machos tienen unos colores mucho más llamativos para atraer a la hembra durante el período de reproducción.

Los colores del macho indicaran su aptitud y su condición física para así indicar qué genes porta.

CLASE: AVES

REPRODUCCIÓN : OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ASIA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Cañón de las Aves



MARTINETE COMÚN

(*Nycticorax nycticorax*)

El esquivo martinete **es una garza de hábitos nocturnos**, que inicia su actividad cuando el resto de los componentes de las ruidosas garceras en las que cría se retiran a descansar. Es entonces cuando esta ave de bello plumaje se dirige hacia sus cazaderos habituales, donde captura peces, anfibios y grandes invertebrados acuáticos. **Muy ligado a la existencia de riberas bien conservadas y de humedales con abundante vegetación palustre**, el martinete parece mostrar algunos síntomas de recuperación tras años de declive.

Controla especies invasoras como el cangrejo americano.



CLASE: AVES

REPRODUCCIÓN : OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA, EUROPA, ASIA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



TARRO CANELO

(*Tadorna ferruginea*)

Esta anátida se encuentra repartido por Eurasia por el norte de África. **El nombre se debe a su color tan característico que presenta en las plumas.** Se puede diferenciar bien al macho de la hembra, por lo que presentan dimorfismo sexual. **El macho presenta un collar negro en el cuello**, mientras que la hembra que no lo tiene, posee la cabeza más blanquecina.

CLASE: AVES

REPRODUCCIÓN : OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO

DISTRIBUCIÓN: EURASIA, ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Cañón de las Aves



AVE MARTILLO

(*Scopus umbretta*)



El nombre se debe a la forma de su **cabeza en forma de martillo**. A pesar de su pequeño tamaño, **construyen unos nidos muy grandes que superan los 2 metros de longitud** y son tan resistentes que podría soportar el peso de una persona. Tiene una dieta muy carnívora, basándose en ranas, peces, gusanos e insectos.



CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



ESPÁTULA AFRICANA

(*Platalea alba*)



Es una **especie típica de humedales** de agua dulce, como lagos, marjales y embalses, pero se deja ver también en albuferas costeras, salinas y estuarios.

Captura pequeños peces e invertebrados acuáticos. Anida en colonias, con frecuencia en compañía de otras aves acuáticas.

Los nidos consisten en pequeñas plataformas de palos y se emplazan sobre árboles parcialmente sumergidos, arbustos, carrizos o islotes rocosos. La puesta habitual consta de dos o tres huevos.

CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Cañón de las Aves



PROYECTO GREFA COLABORACIÓN



GRULLA DAMISELA

(*Anthropoides virgo*)



Es una de las grullas más elegantes. Esta especie es migratoria de larga distancia. Realizan una de las migraciones más sorprendentes soportando temperaturas bajo cero, y vuelos de **8.000 metros de altura**.


Tienden a mostrar las exhibiciones más enérgicas. **La danza de la grulla damisela (cortejo) ha sido descrita como un perfecto "ballet"**

Convenio de colaboración entre aiza (asociación ibérica de zoológicos y acuarios) y grefa (GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA AUTÓCTONA Y SU HÁBITAT) . Para la cría y reintroducción a la naturaleza.



CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: OMNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Poblado Central



LEÓN DEL ATLAS (*Panthera leo leo*)



CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: VULNERABLE

Es una subespecie originaria del norte de África que hoy se encuentra **extinta en libertad**. Los únicos leones vistos en libertad datan del 1950 en Argelia. Su extirpación tiene respuesta en la caza, falta de presas y la reducción de su hábitat natural.

Los descendientes actuales provienen de una colección marroquí y sólo existen bajo el cuidado humano. Su conservación es de gran importancia genética.

Es el único gato que vive en manada, siendo las hembras las que cazan y los machos los que protegen el territorio. Las melenas oscuras son las más atractivas para las leonas ya que es un indicador de salud y/o buena genética.

Poseen un rugido que puede escucharse a 8 km de distancia, y que pueden realizar ya que están dentro del grupo de las **Pantheras** como: Tigre, leopardo y jaguar

BUITRE LEONADO (*Gyps fulvus*)



Dotada de excelentes **adaptaciones para la detección y el consumo de carroña** de gran tamaño. Con más de 2,5 metros de envergadura y un **peso de 6 a 9 kilos**, este carroñero es una de las aves más voluminosas de Europa y también una de las más longevas. Apenas existe dimorfismo sexual. Su cuello, cubierto tan solo por un fino plumón, le permite penetrar en la carroña fácilmente y sin ensuciarse en exceso.


Por su condición de carroñero, **evita la propagación de enfermedades** que pueden provocar los cuerpos en descomposición.

EJEMPLARES MALHERIDOS DEBIDO A ACCIDENTES POR ELECTROCUCIÓN Y DISPAROS DE FURTIVOS



CLASE: AVES
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA, ASIA, EUROPA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Poblado Central



ELEFANTE ASIÁTICO



(*Elephas maximus*)



Las orejas de los elefantes irradian calor para ayudar a refrescarse, también se refrescan con agua que absorben con su trompa y rocían por encima. La trompa es una larguísima nariz que le sirve para oler, respirar, barritar, beber y agarrar cosas, especialmente las que se pueden comer.

Las hembras viven en manadas familiares con sus crías, mientras que los machos suelen vagar en solitario o agruparse ocasionalmente con otros machos.

Clasificado como "en peligro" debido a una reducción del 50% en las últimas tres generaciones. Esta reducción se debe a la pérdida de su hábitat de ocupación y a la calidad del mismo.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ASIA
IUCN: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

JIRafa DE ANGOLA



(*Giraffa camelopardalis angolensis*)



Caracterizadas por su tamaño, patas y cuello largos y un distintivo estampado que diferencia a las 9 subespecies que existen. Tienen un par de cuernos cortos recubiertos de piel y pelo denominado osicono. Los machos establecen y mantienen su jerarquía compitiendo mediante el movimiento del cuello o incluso mediante sacudidas violentas.

Su cuello se sostiene por las mismas 7 vértebras que el resto de los mamíferos. Contienen vasos sanguíneos con válvulas especiales que previenen que baje súbitamente la sangre a la cabeza de la jirafa cuando la inclina hacia abajo para beber.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Gruta de la Noche



POBLADO
CENTRAL



MURCIÉLAGO EGIPCIO (*Rousettus aegyptiacus*)



Habita en cuevas de las que sale por la noche para buscar comida y regresa al amanecer. **Utilizan la vista, y más importante aún, la ecolocación, para orientar su vuelo.** Duermen en colonias colgados boca abajo y con las alas plegadas fuertemente alrededor del cuerpo, muy juntos. Su alimentación se basa en la fruta. Cuando escasea se alimentan también de gusanos, larvas de insectos y hongos.

Son importantes polinizadores de muchos árboles, además debido a su dieta frugívora, no solo polinizan las flores de los árboles frutales, sino que también ayudan como agente principal en la dispersión de semillas para muchas especies arbóreas.

CLASE: MAMÍFERO
REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: FRUGÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA, ASIA, EUROPA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



SELWO AVENTURA Y MURCIÉLAGOS MÁLAGA colaboran en un proyecto de conservación in situ de murciélagos autóctonos.

El turismo de cuevas, la progresiva urbanización, pesticidas, contaminación lumínica, dejan a los murciélagos locales sin espacios. **Por eso, en selwo aventura disponemos de cajas o refugios repartidos por diferentes palmeras del parque, ofreciendo así un lugar seguro para ellos.**

LAGARTO COLA ESPINOSA (*Oplurus cyclurus*)



Esta especie es endémico de **Madagascar**. Vive en zonas áridas y entierra sus huevos en la arena. Habita en zonas con vegetación seca de árboles caducifolios y espinosos y su presencia se correlacionó con la de termitas y troncos caídos.

CLASE: REPTIL
REPRODUCCIÓN: OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: MADAGASCAR
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



Gruta de la Noche

**POBLADO
CENTRAL**

SERPIENTE DEL MAIZ

(*Pantherophis guttatus*)



Viven en los maizales, las mejores áreas para encontrar su alimento y escondite porque hay roedores y éstas se alimentan de ellos.

Su hábitat original lo constituyen los bosques claros y soleados, en especial de coníferas. **Les gusta trepar a estos árboles en busca de pollos de aves.** Habita también en áreas agrícolas, bosques naturales y reforestados, praderas y zonas urbanas.



CLASE: REPTIL
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: AMÉRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



RANA TORO AFRICANA

(*Pyxicephalus adspersus*)




Estas ranas tienen un período activo corto dependiendo de la temporada de lluvias. **La mayor parte de sus vidas la pasan estivando bajo tierra.**

Son carnívoras y consumirá casi cualquier animal que pueda caber en sus enormes bocas. El tamaño de los machos es superior al de las hembras siendo esto inusual.

Están catalogados como «preocupación menor» (LC) a nivel mundial. Sin embargo, se los considera «casi amenazados» (NT) en Sudáfrica debido a la pérdida de hábitat.

CLASE: ANFIBIO
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: AFRICA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR



Reptilario



POBLADO
CENTRAL

IGUANA DE COLA ESPINOSA DE UTILA (*Ptenosauria bakeri*)



La Iguana Negra de Utila vive en un área de 8km² de **Bosques de Manglar en la pequeña isla de Utila**, frente a la costa Caribe de Honduras, Centroamérica. El trabajo de conservación es necesario para su supervivencia.

Mientras la iguana pasa la mayor parte de su vida en manglares, **las hembras migran a las playas u otras áreas arenosas disponibles para anidar**. En consecuencia, esta especie requiere ambos hábitats y la conectividad entre ellos para mantener una población viable

CLASE: REPTIL
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ISLA DE UTILA
IUCN: EN PELIGRO CRÍTICO

PITÓN DE BIRMANIA ALBINA

(*Python bivittatus*)




Puede llegar a los 6 m y es más corpulenta que las otras especies, llegando a pesar **90kg**. Se adapta a una gran variedad de hábitats como marismas, selvas, zonas rocosas, arrozales... Pero siempre debe estar cerca de una fuente de agua.

Tiene un gran sentido del olfato y fosas de calor sobre el labio superior: detectan el calor de la presa para cazar en la oscuridad.

Su principal amenaza son la destrucción de su hábitat y la caza excesiva para conseguir su piel.

CLASE: REPTIL
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ASIA
IUCN: VULNERABLE



Reptilario



POBLADO
CENTRAL



BOA CUBANA

(*Chilabothrus angulifer*)



Esta boa **es endémica de la isla de Cuba**. Puede llegar a medir hasta 6 m, siendo una de las especies más grandes de este género. Terrestre y arborícola, se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, pájaros y lagartos, a los que mata por constricción.

En algunas regiones frecuenta las cuevas, donde se especializa en capturar murciélagos. **Son ovovivíparas, es decir, el huevo se desarrolla dentro de la hembra y nacen como crías ya desarrolladas.**

CLASE: REPTIL
REPRODUCCIÓN : OVOVIVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: CUBA
IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Es la serpiente más grande que se encuentra en África. Es una serpiente constrictora de unos 5 m de longitud como promedio, aunque pueden alcanzar los 7 m de longitud y los 160 kg de peso.

La pitón de Seba es una serpiente de hábitos terrestres, principalmente, aunque suele sumergirse en el agua para cazar. Habita en sabanas, sobre todo arboladas, cerca del agua. **Se alimenta principalmente de roedores, aves terrícolas, antílopes y cerdos.**


Está amenazada por el tráfico de especies entre otros.

Pitón roca

(*Python sebae*)



CLASE: REPTIL
REPRODUCCIÓN : OVÍPARO
ALIMENTACIÓN: CARNÍVORO
DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA
IUCN: CASI AMENAZADA



Reptilario



**POBLADO
CENTRAL**

ESCINCO NARANJA DE SHNEIDER

(*Eumeces shneideri*)



Este lagarto pertenece a la familia Scincidae, palabra originaria del latín para referirse a **extremidades cortas o reducidas**. Poseen un espectacular mecanismo de defensa contra la depredación llamada "autotomía caudal", que consiste en desprenderse de la cola.

Es importante por el control poblacional de insectos y arácnidos.

CLASE: REPTIL

REPRODUCCIÓN : OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: INSECTÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA Y ASIA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Pueden medir hasta 2 metros. Son herbívoros y se reproducen por medio de huevos, que son colocados bajo tierra durante el mes de febrero (verano austral).

El macho se distingue de la hembra porque tiene una cresta más grande y protuberante, la cabeza es corta y no tan alargada. Tienen unas **glándulas a nivel de su membrana sub timpánica** que en la madurez sexual empiezan a crecer y se notan los bultos.

El color verde de su piel les permite confundirse perfectamente con la **vegetación** que hay en su entorno. Su piel está recubierta de pequeñas escamas; tienen una **cresta dorsal** que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy vistosa en los machos.

IGUANA VERDE

(*Iguana iguana*)



CLASE: REPTIL


REPRODUCCIÓN : OVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: AMÉRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Reserva de los lagos



RINOCERONTE BLANCO

(*Ceratotherium simum*)



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: CASI AMENAZADO

El rinoceronte blanco es el segundo animal terrestre mas grande del mundo después del elefante. **Su boca chata le permite pastar hierba a diferencia del rinoceronte negro que tiene la boca triangular y prensil para el ramoneo.**

Estos animales son cazados de forma furtiva por sus cuernos, donde el mercado asiático aún sigue muy activo. **El cuerno del rinoceronte está hecho de queratina**, como las uñas y el pelo.

Pueden comer hasta 50 kg al día de vegetación. Son apodados los jardineros debido a su labor desbrozadora y también son conocidos como los bomberos debido como consecuencia a evitar incendios.


COBO DEL NILO

(*Kobus megaceros*)



Especie de antílope africano que está presente en algunas regiones del sur de Sudán. Su dimorfismo sexual es tan fuerte que **machos y hembras parecen pertenecer a especies distintas**: el macho adulto presenta un color de pelaje marrón oscuro, con una mancha blanca detrás de los largos cuernos que se extiende hacia el cuello. Sin embargo, la hembra es de color amarillo pálido y sin cuernos. Ambos se parecen hasta alcanzar los 2-3 años de edad: en ese momento, el color del pelaje cambia y los cuernos empiezan a crecer.

Es una especie ligada a los humedales, pudiendo vadear en aguas poco profundas y nadar en otras de más profundidad. Es más activo al amanecer y al anochecer, y vive en manadas compuestas por unos 30-50 individuos, pudiendo estar formado por 50 hembras y un único macho o pequeños rebaños exclusivamente masculinos.



CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Reserva de los lagos



WATERBUCK

(*Kobus ellipsiprymnus*)



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Esta especie también es conocida como antílope acuático, ya que **se encuentra cerca de humedales**, y consume plantas acuáticas. Se considera un buen nadador, de ahí su pelaje más áspero adaptado a la flotabilidad.

Presenta unos anillos blancos característicos en la parte trasera, que utilizan para la comunicación.

Sueltan un aceite oloroso en su piel que les ayuda a combatir picaduras de insectos.

ÑU DE COLA BLANCA

(*Connochaetes gnou*)



Se dice que el nombre común de esta especie "gnu" tiene su origen en el nombre hotentote t'gnu, que **hace referencia a las llamadas repetidas de "ge-nu" que hace el macho durante la época de apareamiento**.

Se agrupan en grandes manadas formadas por machos, hembras y crías llegando a sumar entre 20-30 ejemplares. Conviven con otras especies como las cebras para defenderse de sus principales depredadores, las hienas y leones.

No realizan esa famosa migración extensa como los ñu azules, ya que éstos se encuentran limitados en reservas del sur de África.

La cría se pone de pie a los 6 minutos de nacer y sigue a la madre en pocos días. Uno de los principales depredadores de las crías son los chacales.



CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Reserva de los lagos



ASNO SOMALÍ

(*Equus africanus somalicus*)



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: EN PELIGRO CRÍTICO

Este equino salvaje con **llamativas rayas en las patas** se encuentra en peligro crítico, debido a la caza por su carne y a la medicina tradicional. Partes del animal y huesos comidos en sopas, se hace con la esperanza de curar enfermedades como la tuberculosis, entre otras.

Por suerte, este animal está sujeto a conservación ex-situ e in - situ. El objetivo es reproducir al animal bajo el cuidado humano, aumentar su diversidad genética y mejorar las condiciones de esta especie en su hábitat natural.

CEBRA DE BURCHELL

(*Equus quagga burchellii*)



Esta sub- especie está dentro de la especie cebra común o cebra de las llanuras.

Es uno de los equinos salvajes más admirados y llamativos gracias a ese **pelaje único, que además es único en cada individuo, como las huellas dactilares.**

Son animales salvajes, donde el color que predomina es el color negro, así que, ya puedes decir con orgullo que **las cebras son negras con rayas blancas.**

Aunque los científicos siguen investigando por qué tienen estos colores tan llamativos en una sabana marrón, hay muchas teorías que hablan de disuadir "moscas" como la mosca tse-tsé que podría matar a estos individuos en la naturaleza.

Están amenazadas por la reducción del hábitat y por la demanda de su piel.



CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: CASI AMENAZADA

Reserva de los lagos



ARRUÍ

(*Ammotragus lervia*)



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: VULNERABLE

Las principales amenazas en toda la cordillera incluyen la caza furtiva y la destrucción del hábitat, principalmente por el pastoreo de ganado, la recolección de leña, la sequía y la desertificación. El declive del arruí egipcio fue acelerado por la competencia con el ganado y los camellos salvajes.

Se trata de una especie cinegética, cazada por su carne y trofeo, introducida como exótica con fines de caza (trofeo) en diferentes países.

Es una especie invasora en España. Fue introducida en Murcia en 1970 para la caza, expandiéndose con el tiempo a otras regiones de la península. Genera impacto a la vegetación autóctona y compite con otros herbívoros del territorio

ELAND DEL CABO

(*Taurotragus oryx*)




Es considerado el segundo antílope más grande después del Eland gigante. Este animal, pese a ser un animal salvaje, está dentro del grupo "Bovinae" siendo un aspecto curioso ya que el ganado doméstico está cerca evolutivamente.

Estos antílopes pueden vivir en grupos de hasta 500 individuos. Cuando los grupos son bastantes numerosos la hembra también desarrolla el cuerno, que en este caso no es para luchar dentro de su misma especie como los machos, sino para proteger a los pequeños de los depredadores.

Los machos son de mayor tamaño, poseen un cuerno más grueso, una papada mas grande, poseen pelo en la frente en la edad adulta y tienen la cara más oscura.

El Eland también ha sido muy estudiado en la arqueología por las pinturas rupestres en las que aparece en Sudáfrica.

En algunos lugares consumen su carne y su leche.



CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Reserva de los lagos



ORYX CUERNOS CIMITARRA

(*Oryx dammah*)



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: EN PELIGRO

Esta especie es un gran ejemplo de conservación. Fue declarado extinto en la década de los 70 y **gracias a programas de reintroducción han vuelto a la naturaleza.**

La reserva faunística de Ouadi Rimé-Ouadi Achim, en Chad, está patrullada y vigilada, y las comunidades locales de pastores participan en el programa de reintroducción, por lo que la amenaza de caza furtiva para la población liberada se considera actualmente baja, pero es probable que este riesgo aumente a medida que los oryx se dispersen más lejos de la zona central.

Antes de su extinción en la naturaleza, los oryx con cuernos de cimitarra **eran apreciados por la población local por su carne y piel, que utilizaban para hacer cuerdas, bolsas, zapatos y cubiertas de escudos.** También eran el objetivo de los cazadores por sus cuernos

COBO ROJO

(*Kobus leche*)



Los lechwe del sur están asociados con los humedales, prefiriendo los márgenes de aguas poco profundas de las llanuras aluviales y los pantanos (menos de 1 m de profundidad), aunque ocasionalmente pueden nadar a través de áreas de aguas profundas.

Los lechwes del sur han sido eliminados de gran parte de su antigua área de distribución mediante **la caza furtiva para obtener carne.**



CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: CASI AMENAZADO

Reserva de los lagos



DROMEDARIO

(*Camelus dromedarius*)



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA Y ASIA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Este camélido conocido como dromedario habita el continente Africano y Arabia saudí, aunque hoy en día se puede ver en otros lugares del mundo como especie invasora, por ejemplo Australia.

El origen de los camélidos es Americano. Un grupo viajó por el norte de América hasta llegar a Eurasia. En la actualidad tenemos el dromedario de una joroba, y el camello bactriano y salvaje de dos jorobas. En el interior de las jorobas hay grasa para poder sobrevivir en lugares donde la comida y el agua son difíciles de conseguir.

El otro grupo de camélidos que no viajó por el norte de América y permaneció allí, son los que conocemos actualmente como: llamas, guanacos, alpacas y vicuñas.

IMPALA

(*Aepyceros melampus*)



Este antílope pequeño es famoso por su **velocidad**, ya que puede superar los 70 km/h, pero es aún más conocido por los **increíbles saltos**. Es capaz de saltar 3 metros de alto y 10 metros de longitud. Son saltos anti-depredadores, ya que tienen que huir de animales tan rápidos como el guepardo.

Poseen 3 rayas negras en las partes traseras para la comunicación, y además tienen **glándulas metatarsianas** (manchas negras por detrás de las patas traseras). Estas glándulas son para la comunicación y sociabilización.



CLASE: MAMÍFERO


REPRODUCCIÓN: VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA

IUCN: PREOCUPACIÓN MENOR

Reserva de los lagos



HIPOPÓTAMO COMÚN

(*Hippopotamus amphibius*)



Es el tercer animal terrestre más grande del mundo. Viven en África, en humedales, lagos y ríos. **Son considerados una de las especies más peligrosas del continente.**

El animal que está más cerca evolutivamente, son los cetáceos (ballenas, delfines, etc). Los hipopótamos, aunque de diferente forma, están ligados con el medio acuático, de ahí que sean territoriales, ya que deben defender el territorio con agresividad. De lo contrario si hicieran largas migraciones para buscar otros territorios podrían morir por el sol en su piel.

Poseen largos colmillos e incisivos para la defensa, pero **su dieta es completamente herbívora.**

Al contrario de lo que se piensa no saben nadar, no pueden flotar. Tienen un esqueleto muy pesado, así que se hunden y se arrastran por el fondo.

Son los ingenieros de África, ya que realizan caminos bajo el agua importantes para el transporte de nutrientes.



CLASE: MAMÍFERO

REPRODUCCIÓN : VIVÍPARO

ALIMENTACIÓN: HERBÍVORO

DISTRIBUCIÓN: ÁFRICA Y ASIA

IUCN: VULNERABLE



CUIDEMOS DEL MEDIO

- Mantener el **equilibrio mediambiental** es una máxima prioridad para Selwo Aventura, asumiendo el compromiso de proteger las especies de fauna y flora en peligro de extinción.
- Ofrecemos diferentes presentaciones y charlas para aprender sobre nuestros animales y su entorno.
- Participamos en diferentes programas de cría en cautividad de especies amenazadas (**EEPs**), contribuyendo así a la conservación de especies en peligro de extinción.
- Entre los logros conseguidos por el Parque podemos reseñar la cría en cautividad del **Elefante Asiático, el panda rojo o el Oryx dammah** (especie que estuvo extinta en la naturaleza y recuperada gracias al trabajo de los zoos). Tenemos colaboración **con Murciélagos Málaga** donde disponemos de cajas o refugios para la protección de nuestros murciélagos autóctonos.

Disfrutar de la vida en nuestro planeta podría ser difícil si continuamos sin darnos cuenta de los problemas de nuestro entorno, a corto plazo...

El entorno y temática de Selwo Aventura se enfoca en la gran diversidad de especies diferentes y ecosistemas que existen en nuestro planeta. Conseguir apreciar y que generaciones futuras aprendan su gran valor, es de vital importancia. Tenemos que aprender de nuestros errores para dar soluciones a los problemas venideros, y poder apoyar y ayudar a otras zonas del globo que al no haber sufrido estos problemas, no quieren creerlo.

¿Por y para qué?

Porque no estamos solos y debemos aprender a respetar y conservar a las especies con las que convivimos.

¿Por y para quién?

Para los seres humanos y el resto de la biodiversidad

¿Cómo?

Respetando, aprendiendo, enseñando, ayudando, implicándonos...

Es responsabilidad de todos aprender, cuidar y valorar nuestro planeta, así que desde aquí tan solo remarcar que:



EL GRAN PROBLEMA DEL MEDIO AMBIENTE SOMOS NOSOTROS, Y LA ÚNICA SOLUCIÓN... NOSOTROS.





Programas de Colaboración



FUNDACIÓN SAVE THE RHINO: Aporta fondos para el desarrollo del proyecto de conservación del rinoceronte.



EXTENSIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA FOCA MONJE EN LA PENÍNSULA DE CABO BLANCO, MAURITANIA:

La fundación Parques Reunidos, en colaboración con la fundación CBD Hábitat, lleva a cabo un programa de conservación, educación y sensibilización en todos los centros de Parques Reunidos en Europa.



PROYECTO GRULLA DAMISELA: Este proyecto experimental impulsado por AIZA y la ONG GREFA busca reintroducir y recuperar la población de la grulla damisela (*Anthropoides virgo*). Esta especie, que dejó de criar en la Península Ibérica a principios del siglo XX, está siendo criada en cautividad en diversos parques y zoológicos para lograr su reproducción y futura liberación en su hábitat natural.



PANDA ROJO NETWORK: Se trata de una colaboración con el programa in-situ del panda rojo que se centra en emplear a "rangers" en el área de distribución de estos animales en Nepal. Por otro lado, se mantiene un programa educativo y de sensibilización para la población local.



MOVILÍZATE POR LA SELVA: La explotación del coltán y la casiterita, valiosos minerales que hacen posible la tecnología de nuestros móviles, ordenadores y consolas, está en el centro de los conflictos bélicos que producen millones de víctimas y refugiados en la República Democrática del Congo. La minería ilegal explota mano de obra infantil, destruyendo además los hábitats de muchas especies animales, como chimpancés y gorilas.



La Fundación Parques Reunidos ha apoyado un proyecto dirigido por **Jane Goodall España** que consiste en la **recogida y reciclaje de teléfonos móviles** en nuestros parques españoles y cuyo objetivo es reciclar los metales y minerales mencionados con el fin de reducir las necesidades de extraerlos de los yacimientos naturales en los que se encuentran. **RECUERDA QUE PUEDES TRAERNOS LOS MÓVILES QUE NO QUIERAS Y NOSOTROS SE LO HAREMOS LLEGAR AL INSTITUTO JANE GOODALL ESPAÑA.**

Participación y actividades cuyo fin es el de acercar la naturaleza a colectivos infantiles aquejados con enfermedades crónicas y/o larga duración.

